

کشت شما ، تحت حمایت ما

# Agronakk®

PARS

## کیمیا کشت نامی

www.agronakk.com

### Cot-Pax 5% SL



### BAY STAR 18% SC

Cotton Defoliant



### S N-FINAL 54% SC

## تنظیم کننده های رشد پنبه

تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۵۴۰۰۰

agronakk

تهران، زعفرانیه، خیابان شهید اعجازی (آصف)  
نیش کوچه حامد، پلاک ۳۴، طبقه سوم  
کد پستی: ۱۹۸۷۸۶۵۳۱۵

agrobrest®  
GRUP



## ۵۰ اس-ال کت پکس

تنظیم کننده رشد رویشی در پنبه

اگروبست ترکیه PGR

### مزایای کت پکس:

- توقف رشد رویشی
- زود رسی محصول
- کاهش ریزش گل و غوزه پنبه
- ممانعت از سنتز جیبرلیک اسید
- تولید غوزه بیشتر (افزایش عملکرد)

### معرفی:

کت پکس تنظیم کننده رشد گیاهی حاوی ۵۰ گرم بر لیتر مپیکوات کلراید از خانواده کوآرناری آمونیوم میباشد که با جلوگیری از سنتز جیبرلیک اسید باعث جلوگیری از رشد بیش از حد شاخ و برگ پنبه و در نتیجه موجب کاهش ارتفاع بوته پنبه میشود. در نهایت تعادل طبیعی گیاه به سود رشد زایشی (تولید غوزه) تغییر میکند. کت پکس موجب بهبود نفوذ نور و هوا بویژه در قسمت‌های میانی و تحتانی بوته ها شده و باعث کاهش ریزش گل و غوزه پنبه، برداشت سریعتر و آسانتر محصول، نفوذ بهتر حشره کش ها، بهبود کنترل آفات، پایین آمدن میزان پوسیدگی غوزه ها و زود رسی پنبه می گردد.

### مورد مصرف:

میزان مصرف (واحد)	اثر بخشی هدف	محصول
۱-۱/۵ لیتر در هکتار	در مرحله شروع گل دهی (وجود ۷ تا ۱۰ گل سفید در ۱۰ متر ردیف) و یا هنگامی که پنبه رشد فعال داشته و ارتفاع آن ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر است	پنبه

**دوره کارنس:** تا کنون هیچ دوره کارنسی برای این محصول ثبت نشده است.

### مدیریت کاربرد:

#### زمان مصرف و تکرار:

در مرحله شروع گل دهی (وجود ۷ تا ۱۰ گل سفید در ۱۰ متر ردیف و یا هنگامی که پنبه رشد فعال داشته و ارتفاع بوته ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر باشد).

#### محدودیت مصرف:

- در مواردی که قبل یا بعد از محلول پاشی کت پکس مشکل کم آبی، کمبود مواد غذایی خاک و خسارت آفات، بیماریها و علف های هرز وجود داشته باشد از مصرف کت پکس خودداری کنید.
- فاصله زمانی بین مصرف کت پکس تا استفاده از شاخ و برگ پنبه برای دام کمتر از ۳۰ روز نباشد.
- چنانچه زودتر از ۸ ساعت بعد از سمپاشی باران ببارد باعث کاهش اثر بخشی کت پکس میشود.

#### نکات مهم در مصرف کت پکس:

- در شرایطی که ارتفاع بوته به ۶۰ سانتی متر رسیده و پنبه هنوز گل نداده باشد نیز میتوان کت پکس را مصرف کرد.
- اگر مزرعه دارای سابقه رشد رویشی زیاد باشد و یا در حالتی که پس از مصرف نوبت اول کت پکس، شرایط مناسبی برای رشد زیاد وجود داشته باشد محلول پاشی نوبت دوم کت پکس را به میزان نیم لیتر در هکتار ۳ تا ۴ هفته بعد از نوبت اول انجام دهید.
- مقدار آب مصرفی در هکتار ۲۰۰ تا ۴۰۰ لیتر در هکتار باشد.
- کت پکس با اغلب حشره کش ها، فارچ کش ها و کود های برگی قابل اختلاط میباشد. قبل از مصرف در سطح وسیع تست اختلاط در سطح محدود توصیه میگردد.



**Cot-Pax**  
5% SL

## ۵۴ اس سی

# سُون فینال

باز شدن همزمان قوزه های پنبه

اگروبست ترکیه PGR

### مزایای سون فینال:

- افزایش کیفیت پنبه
- برداشت هم زمان محصول
- باز شدن همزمان غوزه های پنبه
- ریزش برگهای پنبه برای برداشت آسانتر

### معرفی:

سون فینال به عنوان یک تنظیم کننده رشد در پنبه حاوی ۴۸۰ گرم بر لیتر اتفنن از خانواده اتیلن و ۶۰ گرم بر لیتر سیکلانیلید از خانواده سیکلانید میباشد. سیکلانیلید باعث بازدارندگی در انتقال اکسین در بافتهای مریستمی گیاه میشود. اکسین باعث رشد طولی سلول های گیاهی شده در نتیجه عدم انتقال اکسین در بافتهای گیاه، رشد رویشی متوقف میشود. اتفنن به عنوان بازدارنده رشد و هورمون پیری عمل کرده و در نتیجه باعث ریزش برگهای پنبه میشود. اثر هم افزایی این دو ماده موثر با هم باعث باز شدن و هم رسی غوزه های پنبه شده و ریزش برگها برای برداشت آسانتر در پنبه میشود..

### مورد مصرف:

میزان مصرف (واحد)	اثر بخشی هدف	محصول
۲ لیتر در هکتار	باعث همرسی و باز شدن هم زمان غوزه های پنبه - ریزش برگهای پنبه	پنبه



**دوره کارنس:** تاکنون دوره کارنسی برای این محصول ثبت نشده است..

**مدیریت کاربرد:**

**زمان مصرف:** وقتی که ۲۵ تا ۳۰ درصد قوزه های پنبه باز شده باشند.

**میزان مصرف:** دو لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی

### نکات مهم در مصرف سون فینال:

- قبل از مصرف سون فینال حتما مزرعه باید دایما پایش شود تا زمان دقیق مصرف طبق توصیه بالا رعایت شود.
- قبل از محلول پاشی از عدم بارش باران ۶ تا ۸ ساعت پس از خاتمه اطمینان حاصل کنید.
- در شرایط عادی ۲ تا ۳ هفته بعد از مصرف سون فینال برداشت محصول انجام شود.
- سون فینال قابلیت اختلاط با هیچ آفت کش و کودی را ندارد.
- مقدار آب مصرفی در هکتار ۲۰۰-۴۰۰ لیتر توصیه میشود.
- تمام سطح گیاه بطور یکنواخت با محلول پوشیده شود.
- در ساعات خنک روز محول پاشی انجام شود .

**S N\_FINAL**  
54% SC

۱۸۰ اس-سی

# بایستار

برگریزپنبه

PGR

اگروبست ترکیه

## مزایای بایستار:

- افزایش کیفیت پنبه
- برداشت هم زمان محصول
- ریزش برگهای پنبه برای برداشت آسانتر

## معرفی:

بایستار به عنوان یک تنظیم کننده رشد در پنبه و باعث ریزش برگهای سبز پنبه می شود. بایستار حاوی ۱۲۰ گرم در لیتر تیدیاژورون از خانواده فنیل اوره و ۶۰ گرم در لیتر دیورون از خانواده اوره میباشد. دیورون به عنوان یک بازدارنده فتو سنتز در گیاه عمل میکند. تیدیاژورون توسط برگهای گیاه جذب شده و با تشکیل لایه اسید آبسزیک در محل اتصال برگ به ساقه باعث ریزش برگها میشود

## مورد مصرف:

میزان مصرف (واحد)	اثر بخشی هدف	محصول
۰/۶ لیتر در هکتار	برگ ریز پنبه	پنبه

## دوره کارنس :

تا کنون هیچ دوره کارنسی برای این محصول ثبت نشده است.

## مدیریت کاربرد:

زمان مصرف : ۱۰ تا ۱۴ روز قبل از برداشت

میزان مصرف : ۶۰۰ سی سی در هکتار بصورت محلول پاشی

## نکات مهم در مصرف بایستار:

قبل از مصرف بایستار حتما مزرعه باید دایما پایش شود تا زمان دقیق مصرف طبق توصیه بالا رعایت شود. قبل از محلول پاشی از عدم بارش باران تا ۲۴ ساعت پس از خاتمه اطمینان حاصل کنید. در صورت بارندگی مجدد تکرار کنید.

اگر از سدیم کلراید، منیزیم کلراید و دیکوات استفاده شده باشد نباید از بایستار استفاده شود.

مقدار آب مصرفی در هکتار ۲۰۰-۴۰۰ لیتر توصیه میشود.

تمام سطح گیاه بطور یکنواخت با محلول پوشیده شود.

بایستار قابلیت اختلاط با هیچ آفت کش و کودی ندارد.

در ساعات خنک روز محول پاشی انجام شود .



**BAY STAR**  
18% SC

Cotton Defoliant